



Αρ. Πρωτοκόλλου 14	Έκδοση 1 <sup>η</sup>	Σεπτέμβριος 2011	Σελίδα 1 από 2
--------------------	-----------------------	------------------	----------------

## ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Συντάχθηκε από ομάδα εργασίας	Αντωνίου Φ. Βελλής Κ. Θεοχάρη-Μπήδιου Ζ. Καρύδα Κ. Κοσμίδου Μ.	Λαλοπούλου Μ. Μοιρασγεντή Μ. Περπερίδου Ο. Σιάπκας Ε. Τούφας Κ.	Τσιούλα Χ. Χαρούπα Σ. Χονδροματίδου Μ.
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας	Κοκόνη Κουτσιαντά - Ζαμπόκα		
Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας	Φανή Αθανασιάδου-Πιτεροπούλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Α.Π.Θ		
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου	Δημήτριος Γρέκας Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ		
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ	Γεώργιος Βέργουλας		

Απόφαση Δ.Σ: Συνεδρίαση 19<sup>η</sup> της 30/08/2011  
Θέμα 49<sup>ο</sup>

Κάθε αντίγραφο του παρόντος εγγράφου ισχύει μόνο  
όταν φέρει την σφραγίδα της πηγής προέλευσης:  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

### ΥΛΙΚΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλήρες monitoring και καπνογραφία	Ελαστικό κηρίο με δυνατότητα οξυγόνωσης
Φορητός Προβολέας	Σύριγγα 20 ml για τη cuff
Μάσκα Ambu	3 αποστειρωμένες μπλούζες
Αναρρόφηση με καθετήρα nelaton (stand-by)	3 ζευγάρια αποστειρωμένα γάντια
Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας με λαβίδα	3 σκούφοι και 3 μάσκες
Λαρυγγοσκόπιο με λάμα 4 ή 5	Αποστειρωμένο τετράγωνο πεδίο
2 στοματοτραχειακοί τραχειοσωλήνες	Αποστειρωμένο σχιστό πεδίο
Διαθερμία μια χρήσης	Betadine solution
Αποστειρωμένες γάζες	1 fl xylocaine
3 σύριγγες των 2,5 ml	2 amp φυσιολογικό ορό
Γάζα τραχειοστομίας	Νεφροειδές μιας χρήσης

## ΦΑΡΜΑΚΑ

Μυοχαλαρωτικό	Xylocaine 2%
Μιδαζολάμη	Adrenaline
Propofol	Atropine

Το μέγεθος των αναλωσίμων υλικών (π.χ γάντια, στοματοτραχειικοί σωλήνες) προσδιορίζεται εκ των προτέρων από τον υπεύθυνο ιατρό.

ΠΠΝΘ ΑΧΕΠΑ